ノ標本ガ2本貼ツテアツタ。其故 THUNBERG 氏ハおほえのころハ採集シテモ亦見テモ居ナカツタノデアル。序ニえのころぐさトあはトハ大變似テ居テ「あはハえのころぐさカ又ハおほえのころカヲ栽培シテ變ツタモノデアラウ」ト云フノヲ屢〻キクカラ其區別ヲ書イテ置カウ。あはニハ第4穎即チ硬化シテキル穎ノ內側ニ雄花ノ退化ニヨツテ出來タ小サナ Palea(花穎) ガ一個アルガえのころぐさニハナイ。之ガ兩種ノ區別點デアツテ本來別種デアル。

尙ホおほえのころト同日ニ見タノハささきびガ *Panicum paucisetum* STEUDEL デアルコト、いぬあはガ *Panicum chondrachne* STEUDEL デアルコト、はひぬめりガ *Panicum contractum* NEES ex STEUDEL デアルコトナドデアル。いぬあはトはひぬめりトハ本田博士ガ氣附イテ詳細ニ發表シテアルコト故繰返ス必要ハナイガささきびノ學名ハ次ノ様ニシナケレバナラヌ。

Panicum paucisetum STEUDEL, Syn. Glum. 52 no. 221 (1855).

Syn. *Setaria excurrens* MIQUEL in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II, 275 (1866), excl. syn.; pro parte, **syn. nov.**

Panicum excurrens (non TRINIUS) FRANCHET & SAVATIER, Enum. Pl. Jap. II, 161 (1876).

Panicum plicatum (non LAMARCK) HENRY in Trans. Asiat. Soc. XXIV Suppl. 106 (1896); MAKINO in Tokyo Bot. Mag. X 67 (1896), etc.

Panicum neurodes (non SCHULTES) HACKEL in Bull. Herb. Boiss. VIII, 644 (1899), 2 sér IV, 528 (1904), etc.

Setaria mariscus MATUDA in Tokyo Bot. Mag. XXIV, 173 (1910).

(和名) ささきび

而シテ此基準標本ハ BUERGER 氏ノ九州デノ採集品デアル。ささきびノ名ニ屢〻用キラレ又ハ用キラレタ *Panicum plicatum* LAMARCK, *Panicum neurodes* SCHULTES, *Panicum mauritianum* WILLDENOW ex SPRENGEL, *Panicum nepalensis* SPRENGEL, *Panicum nervosum* ROXBURGH, *Panicum excurrens* TRINIUS 等ハ皆日本領ニナイ禾本デアル。

又はひぬめりノ學名ニ間違ヘテ用キラレタ *Panicum indicum* LINNÆUS ノ原種ハ穗ノ長サガ 1cm 弱ノモノデ一見シテはひぬめりトハ見分ケラレル。

○こきじのをごけ (小雉尾蘚) ノ新產地 (堀川芳雄)

昭和9年ニ筆者ニヨリ新種トシテ發表サレタこきじのをごけ (*Cyathophorella densifolia* HORIKAWA) ハ本州デハ伊勢國大內山(オホワチヤマ)ニ產スルコトガ報告サレテキタニ過ギナイ。今度、安藝ノ福王寺山、大和ノ大臺ケ原山並ニ入の波溫泉、相州ノ元箱根ニモ本種ノ產スルコトガ明白トナツタ。ヨツテ原始林中ノ樹皮面ヲ仔細ニ探セバ更ニ廣ク各地ニ見ツカルデアラウト信ゼラレル。きじのをごけ (*Cy. japonica* BROTH.) ヨリモ遙カニ小サク光澤ノ無イ白黄綠色デ、葉ノ緣邊ニハ舷部 (Saum) ガヨク發達シテキルノデ區別ハ容易デアル。